



## Região Edafoclimática de Adaptação (REC)

### Características

- Tipo de crescimento: indeterminado
- Altura média de planta: 83 cm
- Peso médio de 1.000 sementes: 165 g
- Acamamento: resistente
- Potencial de ramificação: alto

### Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste	██████████	██████████	██████████
Mancha olho-de-rã	██████████	██████████	██████████
Podridão parda da haste**	██████████	██████████	██████████
Podridão radicular de Phytophthora*	██████████	██████████	██████████
Pústula bacteriana	██████████	██████████	██████████
Vírus da necrose da haste	██████████	██████████	██████████
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	██████████	██████████	██████████
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	██████████	██████████	██████████
Nematoide de cisto	██████████	██████████	██████████

\*Teste para resistência de campo. \*\*Avaliação de campo.  
 A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

### Destaques

- Ampla adaptação, estabilidade e tolerante ao complexo de percevejos, Tecnologia Block®.

## Época de sementeira, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
		2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
		Número de plantas finais por metro*													
102 RS (Missões, Planalto Médio e Alto Vale do Uruguai); SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste)	Até 600			14	14	13	13	13	12	12	12	13	13	14	128 a 138
	Acima 600				13	13	12	12	11	11	11	12	12	13	
103 SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul)	Acima 600				13	13	12	12	11	11	11	12	12	13	117 a 130
	Acima 600			13	13	13	12	12	11	11	11	12	12	13	
201 PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600			15	14	14	13	13	12	12	12	12			114 a 127
	Acima 600		14	14	13	13	12	12	11	11	11	11			
202 PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600				15	14	14	13	13	13	13	13			102 a 120
	Acima 600			15	14	13	13	12	12	12	12	12			
203 PR (Nordeste); SP (Sudoeste); MS (Sul)	Até 600				16	15	15	15	14	14	14	14			105 a 112
204 MS (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600				16	15	15	15	14	14	14	14			98 a 104
	Acima 600			15	15	14	14	13	13	13	13	13			
301 MS (Centro-Norte); GO (Sudoeste)	Até 600					18	18	18	18	18	18	18			98 a 110
	Acima 600				18	18	17	17	17	17	17	17			
302 SP (Norte); GO (Sul)	Até 600				20	18	18	18	18	18	18	20			99 a 107
	Acima 600				20	18	18	18	17	17	17	20			
303 MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste)	Até 600					18	18	18	18	18	18	18			105 a 129
	Acima 600				18	18	17	17	17	17	17	17			
304 GO (Leste); MG (Nordeste) e DF	Acima 600			20	20	18	18	18	18	17	17	17	18	20	105 a 116
401 GO (Centro); MT (Sul)	Até 600					22	22	20	18	18	18	20			93 a 110
	Acima 600			22	20	20	18	18	18	18	18	20			

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | \* Espaçamento entrelinhas de 45 cm. █ Preferencial █ Tolerada

### Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.