BRS 1054IPRO

GMR 5.4 (MRS 1)

INTACTA RR2 PRO™



Região Edafoclimática de Adaptação (REC)

Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Altura média de planta: 95 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 180 g

Acamamento: resistente

Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste			
Mancha olho-de-rã			
Podridão parda da haste*			
Podridão radicular de Phytophthora*			
Pústula bacteriana			
Vírus da necrose da haste			
Nematoide de galha *Meloidogyne incognita*			
Nematoide de galha *Meloidogyne javanica*			
Nematoide de cisto			

*Avaliação de campo.
A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Alto potencial com estabilidade e precocidade;
- Permite semeadura antecipada, encaixando no sistema em sucessão/ rotação da 2ª safra;
- Maior potencial produtivo em altitudes acima de 700 m.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET 2s	SET 3s	SET 4s	OUT 1s	OUT 2s	OUT 3s	OUT 4s	NOV 1s	NOV 2s	NOV 3s	NOV 4s	DEZ 1s	DEZ 2s	Ciclo (dias)
			Número de plantas finais por metro*													
102	RS (Missões, Planalto Médio e Alto Vale do Uruguai); SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste)	Até 600		16	15	14	13	13	13	13	13	14				121 a 126
		Acima 600		15	14	14	13	13	13	13	13	13				
103	PR (Centro-Sul); SC (Centro-Norte e Serra Geral; RS (Serra do Nordeste e Planalto Superior)	Acima 600		15	14	14	13	13	13	13	13	13				109 a 118
	PR (Nordeste); SP (Sul)	Acima 600		16	15	14	13	13	13	13	13	14				

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. Preferencial Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo	Baixa	Média	Alta

Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES