BRS 2361I2X

GMR 6.1 (MRS 2)

PRÉ-LANÇAMENTO

PLATAFORMA INTACTA 2 XTEND

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Altura média de planta: 92 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 173 g

Acamamento: resistente

Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste			■
Mancha olho-de-rã		■	
Podridão parda da haste	(sem informação)		
Podridão radicular de Phytophthora			■
Pústula bacteriana			■
Vírus da necrose da haste			■
Nematoide de galha *Meloidogyne incognita*	■		
Nematoide de galha *Meloidogyne javanica*	■		
Nematoide de cisto	■		

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Maior potencial produtivo em altitudes acima de 600 m da REC 201;
- Permite semeadura antecipada, viabilizando a semeadura do milho safrinha na melhor "janela" de plantio, na região em que a cultivar está indicada.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)		Altitude (m)	SET 2s	SET 3s	SET 4s	OUT 1s	OUT 2s	OUT 3s	OUT 4s	NOV 1s	NOV 2s	NOV 3s	NOV 4s	DEZ 1s	DEZ 2s	Ciclo (dias)
			Número de plantas finais por metro*													
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600			15	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	116 a 125
		Acima 600			14	14	12	12	12	12	12	12	13	14	15	
	PR (Norte); SP (Médio Paranapanema)	Até 600			16	15	14	14	14	14	14	14	15	16	16	
		Acima 600			14	14	12	12	12	12	12	12	13	14	15	

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo	Baixa	Média	Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES