



Região Edafoclimática de Adaptação (REC)

Características

- Tipo de crescimento: indeterminado
Altura média de planta: 95 cm
Peso médio de 1.000 sementes: 188 g
Acamamento: resistente
Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste	██████████	██████████	██████████
Mancha olho-de-rã	██████████	██████████	██████████
Podridão parda da haste	○ (sem informação)		
Podridão radicular de Phytophthora	██████████	██████████	██████████
Pústula bacteriana	██████████	██████████	
Vírus da necrose da haste	██████████	██████████	██████████
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	██████████	██████████	
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	██████████	██████████	
Nematoide de cisto	██████████	██████████	

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Alta performance associada a precocidade;
- Excelente arquitetura de planta com boa ramificação;
- Maior potencial produtivo em altitudes acima de 700 m;
- Opção de refúgio para cultivares I2X com GMR entre 5.1 e 5.5 para a MRS 1.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
		2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
102	Até 600	16	15	15	14	14	14	14	14	15	15	16			109 a 122
	Acima 600	15	15	14	14	13	13	12	12	13	13	15			
103	Acima 600			13	13	12	12	12	12	12	12	13	13		108 a 120
	Acima 600			14	13	12	12	11	11	11	12	13	13		

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. █ Preferencial █ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa Média **Alta**

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

Soja tolerante a sulfoniluréias (STS®)

A tolerância das cultivares a sulfoniluréias é explicada na página 16.

ANOTAÇÕES
