



Região Edafoclimática de Adaptação (REC)

Características

Tipo de crescimento: indeterminado

Altura média de planta: 102 cm

Peso médio de 1.000 sementes: 155 g

Acamamento: resistente

Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

| | Suscetível | Mod. Resistente | Resistente |
|---|------------|-----------------|------------|
| Cancro da haste | | | |
| Mancha olho-de-rã | | | |
| Podridão parda da haste* | | | |
| Podridão radicular de Phytophthora | | | |
| Pústula bacteriana | | | |
| Vírus da necrose da haste | | | |
| Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i> | | | |
| Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i> | | | |
| Nematoide de cisto | | | |

*Avaliação de campo.

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Alto potencial e excelente estabilidade em diferentes épocas de semeadura;
- Opção produtiva e estável de refúgio para áreas de soja INTACTA, grupo de maturidade relativa entre 6.3 e 6.5, na MRS 2, e entre 7.0 e 7.2 na MRS 3.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

| Região Edafoclimática de Adaptação (REC) | Altitude (m) | SET | | OUT | | | | NOV | | | | DEZ | | Ciclo (dias) | |
|--|---|-------------------------------------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|--------------|-----------|
| | | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | 3s | 4s | 1s | 2s | | |
| | | Número de plantas finais por metro* | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | PR (Oeste e Centro-Oeste) | Até 600 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | | | 111 a 129 |
| | | Acima 600 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | PR (Norte); SP (Médio Paranapanema) | Até 600 | | | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | | Acima 600 | | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| 202 | PR (Noroeste); SP (Sudoeste); MS (Sul) | Até 600 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | 106 a 116 |
| 203 | SP (Centro-Sul e Sudoeste) | Até 600 | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | 116 a 125 |
| | | Acima 600 | | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | | | |
| 204 | MS (Centro-Sul e Sudoeste) | Até 600 | | | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 97 a 107 |
| | | Acima 600 | | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | |
| 301 | MS (Centro-Norte); GO (Sudoeste) | Até 600 | | | | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | 94 a 110 |
| | | Acima 600 | | | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| 302 | SP (Norte); MG (Vale do Rio Grande); GO (Sul) | Até 600 | | | | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | 110 a 120 |
| | | Acima 600 | | | | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |
| 303 | MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste) | Até 600 | | | | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | 115 a 125 |
| | | Acima 600 | | | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | |

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. Preferencial Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa Média **Alta**

Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
