



Região Edafoclimática de Adaptação (REC)

Características

- Tipo de crescimento: indeterminado
- Altura média de planta: 88 cm
- Peso médio de 1.000 sementes: 165 g
- Acamamento: resistente
- Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste	██████████	██████████	██████████
Mancha olho-de-rã	██████████	██████████	██████████
Podridão parda da haste*	██████████	██████████	██████████
Podridão radicular de Phytophthora	██████████	██████████	██████████
Pústula bacteriana	██████████	██████████	██████████
Vírus da necrose da haste	██████████	██████████	██████████
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	██████████	██████████	██████████
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	██████████	██████████	██████████
Nematoide de cisto (Raça 3 e 14)	██████████	██████████	██████████

*Avaliação de campo.

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Excelente sanidade, aliada ao alto potencial produtivo até em áreas com presença de nematoides (*Meloidogyne incognita* e *Meloidogyne javanica*, e às raças 3 e 14 do nematoide de cisto);
- Opção de refúgio para áreas de soja INTACTA, com grupo de maturidade relativa entre 5.9 e 6.1 para as MRS 1 e 2 e entre 6.6 e 6.8 para a MRS 3.

Época de sementeira, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET		OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)		
		3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s			
		Número de plantas finais por metro*														
102	SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste)	Até 600			14	13	12	12	12	12	12	12	12	13		126 a 139
		Acima 600			13	12	12	11	11	11	11	11	12			
103	SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul)	Acima 600			13	13	13	12	12	11	11	12	13		126 a 134	
	PR (Nordeste); SP (Sul)	Acima 600			14	13	13	12	12	12	12	12	13			
201	PR (Oeste e Centro-Oeste)	Até 600				15	15	14	14	14	14	14			110 a 119	
		Acima 600			14	14	14	13	13	13	13	13				
	PR (Norte); SP (Médio Parapananema)	Até 600						15	15	15	15	15				
		Acima 600				15	15	14	14	14	14	14				
203	SP (Centro-Sul e Sudoeste)	Até 600						16	16	16	16	16			101 a 110	
		Acima 600				16	16	15	15	15	15	15				
303	MG (Triângulo e Alto Paranaíba); GO (Sudeste)	Acima 600						18	18	17	17	17	17		115 a 116	

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. █ Preferencial █ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa Média **Alta**

Na página 13 há explanações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
