


Região Edafoclimática de Adaptação (REC)



Características

Tipo de crescimento: indeterminado
Altura média de planta: 97 cm
Peso médio de 1.000 sementes: 195 g
Acamamento: resistente
Potencial de ramificação: médio

Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Mancha olho-de-rã	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Podridão parda da haste*	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Podridão radicular de Phytophthora	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Pústula bacteriana	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	<div style="width: 100%; background-color: #f4a460;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	<div style="width: 100%; background-color: #f4a460;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>
Nematoide de cisto	<div style="width: 100%; background-color: #f4a460;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #92d050;"></div>

*Avaliação de campo.

A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Estabilidade e precocidade;
- Alto peso de sementes;
- Alto teor de proteína e hilo claro.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET		OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)
		3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
101	Até 600			17	16	16	16	16	16	16	17			125 a 130
	Acima 600	18	17	15	15	15	15	15	15	15	16			
102	Até 600			17	16	15	15	15	15	16	17	17		117 a 124
	Acima 600		18	17	15	14	14	14	14	15	16	16		
103	PR (Centro-Sul)	Acima 600		18	16	15	14	14	14	14	15	16	16	112 a 124
	PR (Nordeste); SP (Sul)	Acima 600			17	16	15	15	15	15	16	17		

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. ■ Preferencial ■ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa

Média

Alta

Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
