



Região Edafoclimática de Adaptação (REC)

Características

Tipo de crescimento: indeterminado
Altura média de planta: 89 cm
Peso médio de 1.000 sementes: 147 g
Acamamento: resistente
Potencial de ramificação: alto

Reação a doenças

	Suscetível	Mod. Resistente	Resistente
Cancro da haste	████████████████████		
Mancha olho-de-rã	████████████████████		
Podridão parda da haste*	████████████████████		
Podridão radicular de Phytophthora	████████████████████		
Pústula bacteriana	████████████████████		
Vírus da necrose da haste	████████████████████		
Nematoide de galha <i>Meloidogyne incognita</i>	████████████████████		
Nematoide de galha <i>Meloidogyne javanica</i>	████████████████████		
Nematoide de cisto	████████████████████		

*Avaliação de campo.
A reação das cultivares às doenças é avaliada conforme descrito nas páginas 10, 11 e 12.

Destaques

- Alta performance com estabilidade;
- Ótima opção de refúgio para áreas de soja INTACTA, com grupo de maturidade relativa entre 5.7 e 6.1;
- Alto potencial de ramificação e tolerância ao acamamento mesmo em alta fertilidade e regiões de altitude.

Época de semeadura, População de plantas e Ciclo

Esses atributos de lavoura podem variar em razão do clima, solo e manejo, mas em geral seguem os limites apresentados na tabela abaixo.

Região Edafoclimática de Adaptação (REC)	Altitude (m)	SET			OUT				NOV				DEZ		Ciclo (dias)	
		2S	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s		
		Número de plantas finais por metro*														
102 RS (Missões, Planalto Médio e Alto Vale do Uruguai); SC (Oeste e Nordeste); PR (Sudoeste)	Até 600		16	15	14	14	13	13	13	13	13	13	14	15		124 a 127
	Acima 600	16	15	14	14	12	12	12	11	11	11	13	13	15		
103 RS (Serra do Nordeste e Planalto Superior); SC (Centro-Norte e Serra Geral); PR (Centro-Sul)	Acima 600			14	14	13	13	12	12	12	12	12	13	14		123 a 130
	Acima 600		15	14	13	13	13	13	11	11	11	13	13	15		
201 PR (Oeste e Centro-Oeste); SP (Médio Paranapanema)	Acima 600	15	15	14	14	14	14	13	13	13	13	14	15		125 a 131	
	Acima 600		16	15	15	14	14	14	13	13	13	14	15	15		

Onde 1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. | * Espaçamento entrelinhas de 45 cm. █ Preferencial █ Tolerada

Exigência em Fertilidade do solo

Baixa Média Alta

Fora das épocas preferenciais de semeadura, posicionar a cultivar somente em solos de alta fertilidade. Na página 13 há explicações sobre fertilidade do solo.

ANOTAÇÕES
